

Comprimé à 600 mg



## Comment ce médicament agit-il ?

L'azithromycine en comprimé à 600 mg est utilisée pour la prévention d'une infection avec le complexe *Mycobacterium avium* (aussi appelé MAI, CMA ou MAC).



## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, une diminution de l'appétit, des nausées et des vomissements. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

## Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

### Azithromycine

comprimé(s)


fois par semaine

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi

Vendredi  Samedi  Dimanche

Il est important de prendre l'azithromycine de façon régulière et pour toute la durée du traitement.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*



## J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Il a été observé que l'emploi de fortes doses ou une utilisation prolongée d'azithromycine, pouvait présenter un risque d'ototoxicité (trouble de l'audition). Si vous avez des bourdonnements d'oreilles, si vous entendez moins bien ou si vous avez tout autre problème d'audition, **avisez votre médecin**. Ces effets sont habituellement réversibles si vous en **avisez rapidement votre médecin**.

L'azithromycine peut rendre votre peau plus sensible au soleil ou à la lampe solaire. Afin de prévenir cet effet, utilisez un écran solaire avant toute exposition au soleil ou à la lampe solaire et évitez les expositions prolongées. Les écrans solaires recommandés pour la photosensibilité (augmentation de la sensibilité de la peau au soleil) sont: Ombrelle 60 et Anthélios "L".

L'azithromycine peut occasionner une augmentation transitoire des enzymes hépatiques (effet sur le foie). Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de l'azithromycine sur votre foie.

Il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sérieux sur votre peau ou si vous avez de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin**.

**Avisez votre médecin** si vous avez, dans le passé, présenté une réaction allergique ou des effets indésirables sérieux avec l'érythromycine ou la clarithromycine (Biaxin<sup>MD</sup>).



## Est-ce que je peux prendre l'azithromycine avec mes autres médicament ?

- **Antiacides à base d'aluminium et de magnésium (Amphogel<sup>MD</sup>, Diovol<sup>MD</sup>, Maalox<sup>MD</sup>, etc.) :** Ces antiacides peuvent diminuer l'efficacité de l'azithromycine s'ils sont pris au même moment.  
Prenez l'azithromycine au moins 1 heure avant ou 2 heures après l'antiacide.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'azythromycine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement



D'après des données préliminaires, l'azythromycine est le médicament de choix contre le complexe *Mycobacterium avium* durant la grossesse.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation

Conservez l'azithromycine à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_