

AZITHROMYCINE (ZITHROMAX^{MD})

Comment ce médicament agit-il ?

L'azithromycine est un antibiotique. Il est efficace contre une bactérie nommée *Mycobacterium avium* (MAC ou MAI). Cette bactérie peut infecter les personnes qui ont un système de défense plus faible, comme c'est le cas lors d'une infection par le VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Même si elles ne sont pas malades, certaines personnes qui ont le VIH prennent l'azithromycine pour éviter l'infection au *Mycobacterium avium*. Il s'agit d'un traitement de prévention.

L'azithromycine est utilisée avec les médicaments antirétroviraux (anti-VIH). L'azithromycine et les antirétroviraux n'éliminent pas le VIH. Vous risquez toujours de transmettre le virus, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

www.guidetherapeutiquevh.com

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'azithromycine ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.

Grossesse et allaitement

L'azithromycine peut être prise durant la grossesse.

L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

AZITHROMYCINE

comprimé(s) à 600 mg

fois par jour

fois par semaine

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose, même si on ne se sent pas malade.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables ?

| | | |
|--|---|--|
| | Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité Continuez le médicament | - Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales - Étourdissements, confusion, diminution de la concentration - Photosensibilité (peau plus sensible au soleil) |
| | Contactez votre médecin Continuez le médicament | - <u>Rash</u> (rougeurs sur la peau) seul |
| | Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin. | Rash AVEC : <ul style="list-style-type: none">- Peau qui se lève et enflle- Difficulté à respirer- Fièvre |

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incomode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder l'azithromycine ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez l'azithromycine dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

