

# CLARITHROMYCINE (BIAXIN<sup>MD</sup>)

Comprimé à 250 et 500 mg  
et suspension orale à 125 mg/5mL



## Comment ce médicament agit-il ?



La clarithromycine est utilisée en association avec d'autres antibiotiques pour le traitement et la prévention de l'infection avec le complexe *Mycobacterium avium* (MAI, CMA ou MAC). Elle est également employée pour le traitement de plusieurs autres types d'infections.

## Comment prendre ce médicament ?

### Votre posologie

#### Clarithromycine


- \_\_\_\_\_ comprimé(s) à 250 mg  
ou  
\_\_\_\_\_ comprimé(s) à 500 mg  
ou  
\_\_\_\_\_ mL à 125 mg/5 mL
- \_\_\_\_\_ fois par jour, aux \_\_\_\_\_ heures

La clarithromycine peut être prise avec ou sans nourriture.

Si vous utilisez la suspension orale, il faut bien l'agiter avant de prendre la quantité recommandée.

Il est important de prendre la clarithromycine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*



## J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales ou à l'estomac, une diminution de l'appétit, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre la clarithromycine avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

D'autres effets indésirables tels que les maux de tête, étourdissements et une modification du goût peuvent se présenter. Si ce médicament vous donne un mauvais goût ou un goût amer dans la bouche, prenez des bonbons durs non sucrés ou de la gomme à mâcher sans sucre.

*Assurez-vous des effets que la clarithromycine aura sur vous avant de conduire votre voiture ou avant d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*

La clarithromycine peut occasionner une augmentation transitoire des enzymes hépatiques (effet sur le foie). Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les effets de la clarithromycine sur votre foie.

Il a été observé que l'emploi de fortes doses ou une utilisation prolongée de la clarithromycine, pouvait présenter un risque d'ototoxicité (trouble de l'audition). Si vous avez des bourdonnements d'oreilles, si vous entendez moins bien ou si vous avez tout autre problème d'audition, **avisez votre médecin**. Ces effets sont habituellement réversibles si vous en **avisez rapidement votre médecin**.

Rarement, il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin**.

**Avisez votre médecin** si vous avez, dans le passé, présenté une réaction allergique ou des effets indésirables sérieux avec l'érythromycine ou l'azithromycine (Zithromax<sup>MD</sup>).



### **Est-ce que je peux prendre la clarithromycine avec mes autres médicaments ?**

La clarithromycine peut interagir avec plusieurs médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



### **Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la clarithromycine ?**

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

### **Grossesse et allaitement**



Dans la majorité des cas, la clarithromycine ne doit pas être administrée chez les femmes enceintes. Cependant, lorsqu'aucun autre médicament plus sécuritaire ne peut être utilisé, la prise de la clarithromycine peut s'avérer nécessaire.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la clarithromycine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation

Les comprimés de clarithromycine doivent être conservés dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F) et protégés de la lumière. Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

La suspension orale (reconstituée) de clarithromycine peut être conservée 14 jours à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F).

**Ne pas réfrigérer.**

Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.



## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_