

CLINDAMYCINE (DALACIN C^{MD})

Capsule à 150 et à 300 mg



Granules aromatisés pour solution orale à 15 mg/mL



Comment ce médicament agit-il ?



La clindamycine est utilisée en association avec d'autres antibiotiques pour le traitement de plusieurs types d'infections tels que la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC) et la toxoplasmose.

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie


Clindamycine

- _____ capsule(s) à _____ mg
ou
_____ mL à 15 mg/mL
- _____ fois par jour

Il est préférable de prendre la clindamycine avec de la nourriture afin de diminuer les effets indésirables digestifs.

Il est important de prendre la clindamycine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez la dose oubliée immédiatement et la suivante 2 à 4 heures après. Revenez ensuite à votre horaire normal.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Les effets indésirables les plus fréquents sont des douleurs et des crampes abdominales, des nausées, des vomissements et de la diarrhée légère ou des selles molles. Afin de diminuer ces effets, vous pouvez prendre la clindamycine avec de la nourriture. **Avisez votre médecin** si la diarrhée est sévère, persistante ou s'il y a présence de sang dans vos selles.

Il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou si vous avez de la difficulté à respirer, **cessez de prendre le médicament et avisez immédiatement un médecin.**



Est-ce que je peux prendre la clindamycine avec mes autres médicaments ?

Les antidiarrhéiques absorbants avec kaolin (**Donnagel^{MD}**) ou attapulgite (**Kaopectate^{MD}**, **Donnagel^{MD}**, **Diban^{MD}**) peuvent diminuer l'absorption de la clindamycine. Prenez ces antidiarrhéiques 2 heures avant ou 3 à 4 heures après la clindamycine.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la clindamycine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



On ne connaît pas encore les effets de la clindamycine sur le déroulement de la grossesse. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la clindamycine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Les capsules de clindamycine doivent être conservées dans un endroit sec, à la température ambiante (20 à 25°C ou 68 à 77°F) et protégées de la lumière. Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.




La solution orale (reconstituée) est stable, pour une période de 14 jours, à la température ambiante (15 à 25°C ou 59 à 77°F). Ne pas réfrigérer.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____