



Comment ce médicament agit-il ?

Le cotrimoxazole est un antibiotique. Il est efficace contre un microbe nommé *Pneumocystis carinii*. Ce parasite peut infecter les personnes qui ont un système de défense plus faible, comme c'est le cas lors d'une infection par le VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Même si elles ne sont pas malades, certaines personnes qui ont le VIH prennent le cotrimoxazole pour éviter de faire une pneumonie à *Pneumocystis carinii* (PPC). Il s'agit d'un traitement de prévention.

Le cotrimoxazole est utilisé avec les médicaments antirétroviraux (anti-VIH). Le cotrimoxazole et les antirétroviraux n'éliminent pas le VIH. Vous risquez toujours de transmettre le virus, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

Le risque d'avoir certains effets indésirables peut augmenter si le cotrimoxazole est mélangé à d'autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

www.guidetherapeutiquevih.com

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le cotrimoxazole ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



Grossesse et allaitement

Le cotrimoxazole ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte pendant le dernier trimestre de la grossesse. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Comment prendre ce médicament ?

COTRIMOXAZOLE

—	comprimé simple
—	comprimé DS
—	mL (40-200mg/5mL)
<input type="checkbox"/>	1 fois par jour
<input type="checkbox"/>	1 fois aux 2 jours
<input type="checkbox"/>	fois par semaine

Lun ___ Mar ___ Mer ___ Jeu ___ Ven ___ Sam ___ Dim ___

- Prendre avec de la nourriture

- **Boire beaucoup d'eau** (8 à 10 verres par jour)

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose, même si on ne se sent pas malade.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

	Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none"> - Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales - Photosensibilité (peau plus sensible au soleil)
	Contactez votre médecin Continuez le médicament	<ul style="list-style-type: none"> - Rash (rougeurs sur la peau) seul - Anémie : fatigue, essoufflement, palpitations (cœur qui bat vite), pâleur de la peau - Thrombocytopénie : bleus, saignements inexplicables, points rouges sur la peau
	Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.	Rash AVEC : <ul style="list-style-type: none"> - Peau qui se lève et enflé - Difficulté à respirer - Fièvre

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder le cotrimoxazole ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez le cotrimoxazole dans un endroit sec et à la température de la pièce.



Garder hors de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

