

Comment ce médicament agit-il ?



La dapsone est utilisée pour la prévention et le traitement de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC) et de la toxoplasmose.

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Dapsone


- _____ comprimé(s) à 100 mg
_____ fois par jour
- _____ comprimé(s) à 100 mg
_____ fois par semaine

Lundi _____ Mardi _____ Mercredi _____ Jeudi _____
Vendredi _____ Samedi _____ Dimanche _____

La dapsone doit, de préférence, être prise avec de la nourriture ce qui permet d'augmenter son absorption et de diminuer les effets indésirables gastro-intestinaux.

Il est important de prendre la dapsone de façon régulière, à la même heure chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Surtout lorsque prise à jeun, la dapsone peut entraîner chez certaines personnes des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, il est préférable de prendre la dapsone avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Parfois, il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin.**

Avant de prendre ce médicament, **avisez votre médecin ou votre pharmacien** si vous avez une histoire d'allergie aux sulfamidés (Bactrim^{MD}, Septra^{MD}).

La dapsone peut parfois avoir un effet sur votre sang et causer, par exemple, une anémie hémolytique ou une méthémoglobinémie.

L'anémie hémolytique est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang ; elle peut se manifester par de l'essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la peau. **Avisez votre médecin si cela se produit.**

La **méthémoglobinémie** est une diminution de la capacité des globules rouges dans le sang à transporter l'oxygène. Elle peut se manifester par une coloration bleutée des extrémités (pieds et mains). *Avez-vous votre médecin* si vous notez que le bout de vos doigts, vos pieds ou vos lèvres prennent une coloration bleutée.

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les composantes de votre sang.

Certaines personnes présentent des effets tels que de la nervosité, de l'insomnie, des céphalées ou des vertiges. *Assurez-vous des effets que la dapsone aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*

Un des effets indésirables rencontrés avec la dapsone est la neuropathie périphérique qui peut se manifester par de l'engourdissement, une sensation de brûlure, une douleur ou une faiblesse aux extrémités des mains ou des pieds. Si vous présentez des symptômes, *avisez rapidement votre médecin.*



Est-ce que je peux prendre la dapsone avec mes autres médicaments ?

Certains médicaments, lorsqu'ils sont associés avec la dapsone, peuvent augmenter le risque d'effets indésirables.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la dapsone ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une

boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



La dapsone doit être utilisée avec précaution dans ces situations. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la dapsone et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez la dapsone dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____