

### Comment ce médicament agit-il ?



L'éthambutol est utilisé en association avec d'autres antibiotiques pour le traitement de la tuberculose ou pour le traitement et la prévention de l'infection avec le complexe *Mycobacterium avium* (aussi appelé MAI, CMA ou MAC).

### Comment prendre ce médicament ?

#### Votre posologie


##### Éthambutol

- \_\_\_\_\_ comprimé(s) à \_\_\_\_\_ mg
- \_\_\_\_\_ fois par jour
- \_\_\_\_\_ fois par semaine

L'éthambutol peut être pris avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre l'éthambutol de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*



### J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

### Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Certaines personnes peuvent présenter (surtout en début de traitement) des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Afin de diminuer ces effets, vous pouvez prendre l'éthambutol avec de la nourriture et diviser la dose quotidienne en 2 prises : par exemple, si votre dose est de 800 mg (2 comprimés de 400 mg) une fois par jour, prenez plutôt 400 mg (1 comprimé) deux fois par jour.

Il se peut également que vous ressentiez des étourdissements ou de la confusion. *Assurez-vous des effets que l'éthambutol aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*

Un des effets indésirables rencontrés avec l'éthambutol est la neuropathie périphérique qui peut se manifester par de l'engourdissement, une sensation de brûlure, une douleur ou une faiblesse aux extrémités des mains ou des pieds. Si vous présentez ces symptômes, *avisez rapidement votre médecin.*

*Avisez votre médecin* si vous constatez des changements au niveau de vos yeux : une vision embrouillée ou diminuée, de la douleur aux yeux, de la difficulté à discerner le rouge et le vert ou si vous avez des points noirs dans votre champ visuel.

**Avisez votre médecin** si vous constatez de la douleur ou de l'enflure au niveau des articulations (ex. : gros orteil, cheville ou genou) ou si vous souffrez de goutte et constatez une aggravation des crises.



## Est-ce que je peux prendre l'éthambutol avec mes autres médicaments ?

Certains médicaments, lorsqu'ils sont associés avec l'éthambutol, peuvent augmenter le risque de neuropathies périphériques.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'éthambutol ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement



L'éthambutol doit être utilisé avec précaution durant la grossesse. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'éthambutol et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation

Conservez l'éthambutol dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_