

FAMCICLOVIR (FAMVIR^{MD})

Comment ce médicament agit-il ?

Le famciclovir est un médicament antiviral. Il est efficace contre le virus de l'herpès et le virus du zona. Ces virus peuvent infecter plus sérieusement les personnes qui ont un système de défense plus faible, comme c'est le cas lors d'une infection par le VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Certaines personnes qui ont le VIH et qui sont aussi porteurs de l'herpès prennent le famciclovir pour guérir plus rapidement et diminuer la fréquence des épisodes d'herpès génital.

Le famciclovir n'élimine pas le virus de l'herpès. Vous risquez toujours de transmettre le virus de l'herpès et le VIH, par contact sexuel ou avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom en tout temps et éviter complètement les contacts sexuels si des lésions sont présentes, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.
Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

Le famciclovir peut diminuer l'efficacité de plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

www.guidetherapeutiquevh.com



Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le famciclovir ?

Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du famciclovir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le famciclovir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

FAMCICLOVIR

_____ comprimé(s) à _____ mg

_____ fois par jour

- **Avaler en entier.** Ne pas croquer ou écraser.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose, même si on ne se sent pas malade.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables ?

	<p>Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité</p> <p>Continuez le médicament</p>	<ul style="list-style-type: none">- Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales- Mauux de tête, étourdissements, fatigue
	<p>Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.</p>	<p>Rash AVEC :</p> <ul style="list-style-type: none">- Peau qui se lève et enflé- Difficulté à respirer- Fièvre

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder le famciclovir ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez le famciclovir dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

