

Comment ce médicament agit-il ?



L'itraconazole est utilisé pour le traitement ou la prévention des infections fongiques (infection à champignons).

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Itraconazole

___ mL à 10 mg/mL

___ fois par jour


L'itraconazole en solution doit être pris à jeun, soit 1 heure avant de manger ou 2 heures après. La nourriture nuit à l'absorption et à l'efficacité de l'itraconazole en solution.

Lorsque l'infection est présente dans la bouche, bien répartir la solution dans toute la bouche avant d'avalée. Attendez au moins 30 minutes après la prise du médicament avant de rincer la bouche, de boire ou de manger.

Évitez d'accompagner l'itraconazole en solution d'une boisson acide (jus d'orange, jus de tomate, jus de canneberge, limonade, cola, etc.). Les boissons acides pourraient diminuer l'absorption et nuire à l'efficacité de l'itraconazole. Par contre, ces boissons peuvent être consommées en tout temps lorsqu'elles n'accompagnent pas l'itraconazole.

Il est important de prendre l'itraconazole de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

L'itraconazole est habituellement bien toléré.

Parfois l'itraconazole peut occasionner des nausées, des vomissements, une perte d'appétit de la diarrhée et des douleurs abdominales. Afin de diminuer ces effets, vous pouvez prendre l'itraconazole avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin**.

Plus rarement, on peut rencontrer une hépatite (inflammation du foie). **Avisez immédiatement votre médecin** si vous présentez deux ou plusieurs des symptômes suivants : nausées, vomissements, perte d'appétit, fatigue inhabituelle. **Avisez également votre médecin** si votre peau ou le blanc de vos yeux devient jaune ou si votre urine est foncée et que vos selles sont pâles. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de l'itraconazole sur votre foie.

D'autres effets tels que de la somnolence, des céphalées et des étourdissements pourraient survenir. *Assurez-vous des effets que l'itraconazole aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*



Est-ce que je peux prendre l'itraconazole avec mes autres médicaments ?

L'itraconazole peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre l'alcool avec l'itraconazole ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



Généralement, l'itraconazole ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte sauf dans certaines situations précises.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

L'itraconazole en solution peut être conservé 3 mois à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F) et protégé de la lumière.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____