

Comment ce médicament agit-il ?



Le kéroconazole est utilisé pour le traitement ou la prévention des infections fongiques (infection à champignons).

Comment prendre ce médicament ?

Si vous utilisez la suspension orale, il faut bien l'agiter avant de prendre la quantité recommandée.

Votre posologie

Kétoconazole


- comprimé(s) à 200 mg
 fois par jour

Le kéroconazole doit être pris avec de la nourriture. La nourriture améliore l'absorption et l'efficacité du kéroconazole.

La prise d'un jus d'orange ou d'un Coca-Cola^{MD} 15 minutes avant le kéroconazole peut également augmenter son absorption.

Il est important de prendre le kéroconazole de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Le kéroconazole peut occasionner des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de la diarrhée et des douleurs abdominales. Afin de diminuer ces effets, vous pouvez prendre le kéroconazole avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Parfois le kéroconazole augmente les enzymes du foie. Plus rarement, on peut rencontrer une hépatite (inflammation du foie). ***Avisez immédiatement votre médecin*** si vous présentez deux ou plusieurs des symptômes suivants : nausées, vomissements, perte d'appétit, fatigue inhabituelle. ***Avisez également votre médecin*** si votre peau ou le blanc de vos yeux devient jaune ou si votre urine est foncée et que vos selles sont pâles. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet du kéroconazole sur votre foie.

D'autres effets tels que de la somnolence, des céphalées et des étourdissements pourraient survenir. ***Assurez-vous des effets que le kéroconazole aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.***

A l'occasion, une augmentation anormale des glandes mammaires (seins) chez l'homme (gynécomastie), une diminution de la libido et même une impuissance peuvent survenir suite à la prise du kéroconazole.

Parfois, une photophobie (augmentation de la sensibilité des yeux au soleil) peut être présente. Afin de diminuer ce problème, portez des verres fumés.



Est-ce que je peux prendre le kéroconazole avec mes autres médicaments ?

- **Les antiacides tels que ces agents: Maalox^{MD}, Amphogel^{MD}, Diovol^{MD}**

Ces agents diminuent l'absorption et par conséquent l'efficacité du kéroconazole. *Évitez ces associations ou prenez le kéroconazole 2 heures avant ou au moins 6 heures après ces médicaments.*

- **Autres médicaments utilisés contre l'acidité gastrique: ranitidine (Zantac^{MD}), famotidine (Pepcid^{MD}), cimétidine (Tagamet^{MD}), nizatidine (Axid^{MD}), oméprazole (Losec^{MD}), lansoprazole (Prevacid^{MD}), pantoprazole (Pantoloc^{MD})**

L'utilisation de ces agents pourrait nuire à l'absorption et à l'efficacité du kéroconazole. À ce moment, il se peut que votre médecin augmente la dose du kéroconazole ou modifie votre thérapie.

Le kéroconazole peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le kéroconazole ?

Il est préférable d'éviter les boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) durant le traitement et jusqu'à 24-48 heures après l'arrêt du traitement avec le kéroconazole. La prise d'alcool avec le kéroconazole pourrait amener des effets indésirables tels que de la douleur à l'estomac, des nausées ou des vomissements, des maux de tête, des rougeurs au visage, etc.

Grossesse et allaitement



Le kéroconazole ne devrait pas être utilisé chez la femme enceinte.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez le kéroconazole dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____