

# ISETHIONATE DE PENTAMIDINE

## (PENTACARINAT<sup>MD</sup>)

### Administration intraveineuse



#### Comment ce médicament agit-il ?



La pentamidine est utilisée pour la prévention et le traitement de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC).

#### Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Pentamidine
_____ mg
aux _____ semaine(s)

#### Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



**L'hypotension** (diminution de la tension artérielle) est un effet que l'on peut observer avec la pentamidine intraveineuse, cependant on vous administrera la pentamidine sur une longue période afin d'éviter ce problème.

Rarement, certaines personnes présentent de l'anémie.

**L'anémie** est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang ; elle peut se manifester par de l'essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la peau. **Avisez votre médecin** si vous présentez ces effets.

La pentamidine intraveineuse peut aussi avoir un effet sur les électrolytes dans votre sang (potassium, calcium et magnésium). Votre médecin fera des prises de sang régulières afin de vérifier les électrolytes et les composantes de votre sang. **Avisez votre médecin** si vous avez des paresthésies périphériques (picotements autour de la bouche), des spasmes, des crampes ou des contractions musculaires.

La pentamidine peut occasionnellement causer de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie.

**L'hyperglycémie** est une augmentation anormale du taux de sucre dans votre sang. Elle peut se manifester par une soif intense, un besoin fréquent d'uriner, une grande fatigue, une somnolence, une perte de poids, une vision embrouillée, de la faim, des nausées, des vomissements. **Avisez rapidement votre médecin** si vous ressentez ces symptômes.

**L'hypoglycémie** est une diminution anormale du taux de sucre dans votre sang. Elle peut se manifester par une faim intense, des maux de tête, des sueurs, de l'irritabilité, de l'agressivité, de la faiblesse, des tremblements, des étourdissements. Mangez un aliment sucré ou buvez un jus de fruit et **avisez rapidement votre médecin** si vous ressentez ces symptômes.

En cas d'hyperglycémie (si vous ressentez un besoin fréquent d'uriner, fatigue, somnolence, soif, vision embrouillée, faim, nausées et vomissements), **avisez rapidement votre médecin**.

Parfois, la pentamidine intraveineuse peut avoir un effet sur les reins. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les effets de la pentamidine sur vos reins.



## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la pentamidine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments et augmenter le risque de développer une pancréatite.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement




On ne connaît pas encore les effets de la pentamidine sur le déroulement de la grossesse. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la pentamidine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_