

## Comment ce médicament agit-il ?



La primaquine est un anti-infectieux utilisé en association avec la clindamycine pour le traitement de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC).

## Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

### Primaquine


\_\_\_\_\_ comprimé(s) à 15 mg

1 fois par jour

La primaquine peut être prise avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre la primaquine de façon régulière, à la même heure chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*



### J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre la primaquine avec de la nourriture ou avec un antiacide (ex. Maalox<sup>MD</sup>, Diovol<sup>MD</sup>). Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Ce médicament peut produire des étourdissements. *Assurez-vous des effets que la primaquine aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*

Rarement, la primaquine peut causer une anémie hémolytique ou une méthémoglobinémie.

L'**anémie** est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang ; elle peut se manifester par de l'essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la peau. **Avisez votre médecin** si vous ressentez ces effets.

**La méthémoglobinémie** est une diminution de la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène. Elle peut se manifester par une coloration bleutée des extrémités. **Avisez votre médecin** si vous ressentez ces effets.

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les composantes de votre sang.



## Est-ce que je peux prendre la primaquine avec mes autres médicaments ?

Certains médicaments lorsqu'associés avec la primaquine peuvent augmenter les effets indésirables sur le sang.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la primaquine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement



On ne connaît pas encore les effets de la primaquine sur le déroulement de la grossesse. Son utilisation dans certaines situations (fœtus avec une déficience en G-6-PD) peut être dangereuse.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la primaquine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation

Conservez la primaquine dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_