

## Comment ce médicament agit-il ?



La pyrazinamide est un antibactérien utilisé en association avec d'autres anti-infectieux pour le traitement ou la prévention de la tuberculose.

## Comment prendre ce médicament ?

### Votre posologie


#### Pyrazinamide

- \_\_\_\_\_ comprimé(s) à 500 mg
- \_\_\_\_\_ fois par jour
- \_\_\_\_\_ fois par semaine

La pyrazinamide peut être prise avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre la pyrazinamide de façon régulière, à la même heure chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*



## J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de l'anorexie (perte d'appétit), des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre la pyrazinamide avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

La pyrazinamide peut avoir un effet sur votre foie. On peut noter une augmentation transitoire des enzymes hépatiques (foie) et rarement une hépatite. L'hépatite se manifeste par des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, une fatigue inhabituelle, une jaunisse (coloration jaune de la peau et du blanc des yeux), une urine foncée et des selles pâles. **Avisez votre médecin** si vous présentez ces symptômes. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de la pyrazinamide sur votre foie.

La pyrazinamide peut avoir un effet sur vos articulations. **Avisez votre médecin** si vous avez de la douleur ou de l'enflure (gros orteil, cheville ou genou par exemple).

Rarement, une réaction allergique peut survenir. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin**.

Avant de prendre la pyrazinamide, **avisez votre médecin** si vous avez une histoire d'allergie à la niacine (vitamine B3), l'isoniazide (Isotamine<sup>MD</sup>) ou l'étonamide (Trecator<sup>MD</sup>).



## Est-ce que je peux prendre la pyrazinamide avec mes autres médicaments ?

Pour les patients **diabétiques** qui mesurent le taux des cétones dans l'urine avec l'un des tests suivants : Kétostick, Kéto-Diastix ou Chemstrip K, G ou GK, les résultats peuvent être faussés.

Vérifiez avec votre médecin avant de modifier votre diète ou si le dosage de vos médicaments pour le diabète doit être modifié.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la pyrazinamide ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement



On ne connaît pas encore les effets de la pyrazinamide sur le déroulement de la grossesse. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la pyrazinamide et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation


Conservez la pyrazinamide dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_