

PYRIMÉTHAMINE (DARAPRIM^{MD})

Comprimé à 25 mg



Comment ce médicament agit-il ?



La pyriméthamine est un antibiotique utilisé en association avec un autre antibiotique pour le traitement ou la prévention de la toxoplasmose. Elle est également employée en association avec la dapsone (Avlosulfon^{MD}) pour la prévention de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC).

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre la pyriméthamine avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.


Vous pouvez également ressentir une sécheresse de la bouche et de la gorge. Afin de diminuer ce problème, buvez de l'eau ou du jus. Vous pouvez également sucer des glaçons, des bonbons ou mâcher de la gomme sans sucre.

La pyriméthamine peut conduire à une déficience en folate et causer de l'anémie ou de la neutropénie. **Afin de diminuer les risques d'anémie votre médecin vous prescrira de l'acide folinique (Leucovorin^{MD}) que vous devrez prendre avec la pyriméthamine.**

L'**anémie** est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang ; elle peut se manifester par de l'essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la peau. **Avisez votre médecin** si vous ressentez ces effets.

La **neutropénie** est une diminution du nombre de globules blancs, éléments du sang nécessaires à combattre les infections.

J'ai oublié de prendre une dose !



Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Rarement, une thrombocytopenie peut se présenter. La **thrombocytopenie** est une diminution du nombre de plaquettes (éléments du sang nécessaires pour la coagulation, pour arrêter un saignement) dans le sang; elle peut se manifester par des ecchymoses (bleus) ou saignements inexplicables. **Avisez votre médecin** si vous notez une coloration noirâtre de vos selles, du sang dans vos urines, l'apparition de points rouges sur votre peau et si vous avez des blessures qui tardent à guérir. Par des prises de sang régulières votre médecin surveillera les composantes de votre sang.

Parfois, la pyriméthamine peut occasionner une réaction allergique. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin**.

Certaines personnes présentent des effets tels que de la nervosité, de l'insomnie, des céphalées ou des vertiges. *Assurez-vous des effets que la pyriméthamine aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*



Est-ce que je peux prendre la pyriméthamine avec mes autres médicaments ?

Certains médicaments associés à la pyriméthamine peuvent augmenter les effets indésirables sur le sang. Votre médecin effectuera un suivi plus étroit de votre formule sanguine complète et modifiera votre thérapie si nécessaire.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la pyriméthamine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



Certains risques sont présents avec l'utilisation de la pyriméthamine durant la grossesse. Cependant, la pyriméthamine peut être utilisée dans le traitement de la toxoplasmose chez les femmes enceintes lorsque clairement indiquée.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la pyriméthamine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez la pyriméthamine dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____