

Tadalafil (Cialis^{MD}), Sildenafil (Viagra^{MD}) et Vardenafil (Levitra^{MD})



COMMENT CES MÉDICAMENTS AGISSENT-ILS ?

Le Cialis, le Levitra et le Viagra sont des inhibiteurs sélectifs de la phosphodiestérase 5 (PDE5) et sont utilisés pour les problèmes érectiles (impuissance).

Avec une stimulation sexuelle, ces médicaments aident à augmenter le volume sanguin dans le pénis favorisant ainsi l'érection.

Le Cialis, Levitra et Viagra ne vous protègent pas et ne protègent pas votre partenaire contre les maladies transmises sexuellement. Il est important de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom de latex).



COMMENT PRENDRE CES MÉDICAMENTS ?

Le Cialis, le Levitra et le Viagra peuvent être pris avec ou sans nourriture.

Cialis

Cialis 10 mg (maximum 20 mg) 30 à 60 minutes avant l'activité sexuelle. Pas plus d'une fois par jour. L'effet du Cialis dure environ 36 heures.



Levitra

Levitra 10 mg (maximum 20 mg) 60 minutes avant l'activité sexuelle pas plus d'une fois par jour. L'effet du Levitra dure environ 4 à 5 heures.

Pour les personnes de plus de 65 ans ou avec un problème hépatique : Levitra 5 mg (maximum 10 mg) par jour.

Viagra

Viagra 25-50 mg (maximum 100 mg) 1 heure avant l'activité sexuelle pas plus d'une fois par jour. L'effet du Viagra dure environ 4 heures.

Pour les personnes de plus de 65 ans ou avec un problème hépatique : Viagra 25 mg par jour.

MÉLANGE DE MÉDICAMENTS ET DROGUES RÉCRÉATIONNELLES

Des ajustements de la dose sont nécessaires avec certains médicaments alors qu'avec d'autres médicaments il faut s'abstenir de prendre le Cialis, Levitra et Viagra.

1. Médicament pour le VIH : Angenerase^{MD}, Crixivan^{MD}, Fortovase^{MD}, Invirase^{MD}, Kaletra^{MD}, Norvir^{MD}, Reyataz^{MD}, Rescriptor^{MD}, Viracept^{MD}, Tipranavir

Médicament contre les champignons : Kétoconazole (Nizoral^{MD}), Itraconazole (Sporanox^{MD})

Antibiotiques : Érythromycine, Clarithromycine (Biaxin^{MD})

Les doses de Cialis, Levitra et Viagra devront être ajustées.

- Cialis 10 mg aux 72 heures.
- Levitra 2.5 mg aux 24 heures et même 2.5 mg aux 72 heures en présence du Norvir et Reyataz.
- Viagra 25 mg aux 48 heures.



2. Médicaments avec nitrates :

Nitro-Dur^{MD}, Nitroligual^{MD}, Nitro-BID^{MD}, Minitran^{MD}, Transderm Nitro^{MD}, Isorbide^{MD}, Dilatrace SR^{MD}, Imdur^{MD}, Ismo^{MD}.

Drogue récréationnelle avec nitrates : Poppers

Ne pas utiliser de Cialis, Levitra et Viagra avec les nitrates.

3. Médicaments Alpha-1 bloqueurs : Terazocin (Hytrin^{MD}), Prazocin (Minipress^{MD}), Doxazocin (Cardura^{MD}), Tamsulosin (Flomax^{MD})

Ceux-ci sont contre-indiqués avec le Levitra et Cialis. Avec le Viagra il faut diminuer la dose à 25 mg pas plus d'une fois par jour et espacer de 4 heures avec les alpha-1 bloqueurs.

Le jus de pamplemousse et plusieurs autres médicaments peuvent interagir avec le Cialis, Levitra et Viagra. Consultez votre médecin et votre pharmacien avant de prendre tout médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Plus communs :

- Maux de tête,
- Flushing (rougeur et chaleur au niveau du visage et du cou),
- Congestion nasale,
- Douleurs à l'estomac.

Rarement :

Une érection qui ne disparaît pas (priapisme):

Si vous avez une érection qui dure plus de 4 heures, présentez-vous dans un hôpital. Le priapisme doit être traité rapidement pour éviter des dommages sérieux qui pourraient avoir comme conséquence ultime de ne plus avoir d'érection.

Changements de la vue:

Voir les objets avec une teinte bleutée ou avoir de la difficulté à distinguer le bleu du vert.

Douleurs thoraciques :



Parlez en rapidement à votre médecin si vous avez des douleurs à la poitrine après l'utilisation du Cialis, Levitra ou Viagra.

OÙ ET COMMENT GARDER LE CIALIS, LEVITRA ET VIAGRA ?

Conservez le Cialis, le Levitra et le Viagra dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Gardez hors de la portée des enfants.



CONSEILS GÉNÉRAUX

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé. Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource: _____

Téléphone : _____