

Comprimé à 500 mg



Comment ce médicament agit-il ?



La sulfadiazine est un antibactérien utilisé en association avec d'autres anti-infectieux pour le traitement de la toxoplasmose. Elle est également employée pour le traitement de plusieurs autres types d'infections.

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Sulfadiazine

comprimé(s) à 500 mg


fois par jour

La sulfadiazine doit préféablement être prise à jeun, soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas.

À moins d'avis contraire de votre médecin, prenez la sulfadiazine avec un grand verre d'eau et continuez à boire chaque jour au moins 1.5 litre (8 à 10 verres) d'eau ou d'autres liquides. Ceci aidera votre organisme à mieux éliminer le médicament.

Il est important de prendre la sulfadiazine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps..

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre la sulfadiazine avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin.**

Avant de prendre la sulfadiazine, avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une allergie aux sulfas que l'on peut retrouver dans certains antibiotiques diurétiques (médicament pour éliminer l'eau) ou certains médicaments pour traiter le diabète.

La sulfadiazine peut rendre votre peau plus sensible au soleil ou à la lampe solaire. Afin de prévenir cet effet, utilisez un écran solaire avant toute exposition au soleil ou à la lampe solaire et évitez les expositions prolongées. Les écrans solaires recommandés pour la photosensibilité (augmentation de la sensibilité de la peau au soleil) sont: Ombrelle 60 et Anthélios "L".

Parfois, la sulfadiazine peut avoir un effet sur votre sang et causer de l'anémie, de la neutropénie ou de la thrombocytopénie.

L'anémie est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang ; elle peut se manifester par

de l'essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la peau. ***Si cela se produit, avisez votre médecin.***

La **neutropénie** est une diminution du nombre de globules blancs, éléments du sang nécessaires à combattre les infections.

La **thrombocytopénie** est une diminution du nombre de plaquettes (éléments du sang nécessaires pour la coagulation, pour arrêter un saignement) dans le sang, elle peut se manifester par des ecchymoses (bleus) ou saignements inexplicables. ***Avisez votre médecin*** si vous notez une coloration noirâtre de vos selles, du sang dans vos urines, l'apparition de points rouges sur votre peau et si vous avez des blessures qui tardent à guérir.

Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les composantes de votre sang.

D'autres effets tels que des maux de tête, de la fatigue, de la somnolence, des étourdissements pourraient survenir. *Assurez-vous des effets que la sulfadiazine aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*



Est-ce que je peux prendre la sulfadiazine avec mes autres médicaments ?

- **Contraceptifs oraux (pilule contraceptive)**
L'efficacité de ce moyen de contraception peut être diminuée pendant le traitement à la sulfadiazine. Il est recommandé de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que le condom en latex.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la sulfadiazine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



La sulfadiazine ne devrait pas être utilisée à la fin de la grossesse. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la sulfadiazine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez la sulfadiazine dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____