

TRIMÉTHOPRIME (PROLOPRIM^{MD})

Comprimé à 100 mg et 200 mg



Comment ce médicament agit-il ?



Le triméthoprime est un antibactérien utilisé en association avec d'autres anti-infectieux pour la prévention et le traitement de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC). Il est également employé pour le traitement de plusieurs types d'infections bactériennes.

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Triméthoprime


_____ comprimé(s) à _____ mg

_____ fois par jour

Le triméthoprime doit être pris idéalement à jeun, soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas.

Il est important de prendre le triméthoprime de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre le triméthoprime avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Rarement, il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer **avisez immédiatement un médecin.**

Lorsqu'utilisé à fortes doses, le triméthoprime peut conduire à une déficience en acide folinique et causer de l'anémie.

L'**anémie** est une diminution du nombre de globules rouges dans le sang ; elle peut se manifester par de l'essoufflement, de la fatigue ou une faiblesse inhabituelle, une perte d'appétit et une pâleur de la peau. **Si cela se produit, avisez votre médecin.**



Est-ce que je peux prendre le triméthoprime avec mes autres médicaments ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le triméthoprime ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux), qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



On ne connaît pas bien les effets du triméthoprime sur le déroulement de la grossesse. Le triméthoprime devrait être utilisé chez les femmes enceintes seulement lorsque les bénéfices sont clairement établis. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre du triméthoprime et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez le triméthoprime dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86 °F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____