

VALACYCLOVIR (VALTREX^{MD})

Comment ce médicament agit-il ?

Le valacyclovir est un médicament antiviral. Il est efficace contre le virus de l'herpès et le virus du zona. Ces virus peuvent infecter plus sérieusement les personnes qui ont un système de défense plus faible, comme c'est le cas lors d'une infection par le VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

Certaines personnes qui ont le VIH et qui sont aussi porteurs de l'herpès prennent le valacyclovir pour aider à guérir plus rapidement et diminuer la fréquence des épisodes d'herpès génital.

Le valacyclovir n'élimine pas le virus de l'herpès. Vous risquez toujours de transmettre le virus de l'herpès et le VIH, par contact sexuel ou avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom en tout temps et éviter complètement les contacts sexuels si des lésions sont présentes, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.

Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Mélange de médicaments !

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

www.guidetherapeutiquevh.com

Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec le valacyclovir ?

On ne connaît pas encore les effets du valacyclovir avec l'alcool.

Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.



Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du valacyclovir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre le valacyclovir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être. L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Comment prendre ce médicament ?

VALACYCLOVIR

— comprimé(s) à 500 mg

— fois par jour

Prendre le valacyclovir avec ou sans les repas, avec un peu d'eau.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose, même si on ne se sent pas malade.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.



Quels sont les effets indésirables ?

	<p>Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité</p> <p>Continuez le médicament</p>	<ul style="list-style-type: none">- Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales- Maux de tête, étourdissements, fatigue
	<p>Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.</p>	<ul style="list-style-type: none">- <u>Allergie</u> : Rash (rougeurs sur la peau), fièvre, difficulté à respirer

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder le valacyclovir ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez le valacyclovir dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

