



Comment ce médicament agit-il ?

Harvoni^{MC} est une combinaison de deux médicaments, soient lédipasvir et sofosbuvir, indiqués pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Harvoni^{MC} bloque plusieurs étapes du processus de réPLICATION du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Harvoni^{MC} → 1 comprimé **1 fois** par jour

Il peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de prendre Harvoni^{MC} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 8, 12 jusqu'à 24 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De votre condition hépatique
- De la réponse à un traitement antérieur
- De votre condition rénale

Est-ce que je peux prendre Harvoni^{MC} avec mes autres médicaments?

Informez votre professionnel de la santé particulièrement si vous prenez ce qui suit:

- Médicaments pour contrôler l'insuffisance ou le rythme cardiaque comme l'amiodarone (Cor-darone), la digoxine (Lanoxin, Toloxin)
- Médicaments pour le traitement de la tuberculose comme la rifampine (Rifater, Rifadin, Ro-fact), la rifabutine (Mycobutin)

- Médicaments pour prévenir les crises convulsives comme la carbamazépine (Tégrétol), l'oxcarbazépine (Trileptal), le phénobarbital (Pheno-barb), la phénytoïne (Dilantin)
- Médicaments pour les brûlements d'estomac, le reflux gastrique ou les ulcères comme les antiacides (Maalox, Gaviscon), la ranitidine (Zantac), la famotidine (Pepcid), la nizatidine (Axicid), la cimétidine (Tagamet), l'oméprazole (Losec, Olex), le pantoprazole (Pantoloc), l'esoméprazole (Nexium, Vimovo), le lansoprazole (Prevacid), le rabéprazole (Pariet)
- Médicaments pour abaisser le taux de cholestérol comme la rosuvastatine (Crestor)
- Médicament contre l'infection par le VIH comme le ténofovir DF (Truvada, Viread, Complera, Stri-bild, Delstrigo, Atripla), le tipranavir (Aptivus)
- Produit naturel : Millepertuis (*Hypericum perforatum*)

Ces médicaments interagissent avec Harvoni^{MC}. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit pourront vous être proposés.

D'autres médicaments peuvent aussi interagir avec Harvoni^{MC}. Vous devez informer votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Harvoni^{MC} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les principaux effets indésirables observés de Harvoni^{MC} sont d'intensité légère et ne nécessite pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si vous avez des vomissements :

- **Moins de 5 heures après la prise d'Harvoni^{MC},** il faut reprendre une autre dose.
- **Plus de 5 heures après la prise d'Harvoni^{MC},** il faut reprendre la dose suivante au moment prévu initialement.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Harvoni^{MC} à une température inférieure à 30°C (86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 18 h



Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du lédipavir et du sofobusvir chez la femme enceinte. Les femmes en âge de procréer devraient utiliser une méthode de contraception adéquate.

Discutez-en avec votre médecin.

La présence du lédipavir et du sofobusvir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Harvoni^{MC}.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____