



Comment ce médicament agit-il ?

Maviret^{MD} est une combinaison de deux médicaments, soient glécaprévir et pibrentasvir, indiqués pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Maviret^{MD} bloque plusieurs étapes du processus de réplication du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Maviret^{MD} → 3 comprimés **1 fois** par jour

Les comprimés doivent être pris en une seule fois **avec de la nourriture** et doivent être avalés entiers.

Il est important de prendre Maviret^{MD} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 8, 12 jusqu'à 16 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De votre condition hépatique
- De la réponse à un traitement antérieur
- De votre condition rénale

Votre médecin vous indiquera pendant combien de temps exactement vous devrez prendre Maviret^{MD}.

Est-ce que je peux prendre Maviret^{MD} avec mes autres médicaments?

Informez votre professionnel de la santé particulièrement si vous prenez ce qui suit:

- Médicaments pour traiter les caillots sanguins comme le dabigatran étexilate (Pradaxa)

- Médicaments contenant de l'éthinylestradiol tels que les comprimés et les anneaux vaginaux utilisés à des fins de contraception
- Médicaments pour prévenir les crises convulsives comme la carbamazépine (Tégrétol), l'oxcarbazépine (Trileptal), le phénobarbital (Phenobarb), la phénytoïne (Dilantin)
- Médicaments pour le traitement de la tuberculose comme la rifampine (Rifater, Rifadin, Rofact), la rifabutine (Mycobutin)
- Médicaments pour abaisser le taux de cholestérol comme l'atorvastatine (Lipitor), la simvastatine (Zocor), la lovastatine (Mevacor)
- Médicament contre l'infection par le VIH comme l'atazanavir (Reyataz), le darunavir (Prezista, Prezcobix), le ritonavir (Norvir), le lopinavir (Kaletra), l'éfavirenz (Sustiva, Atripla), l'étravirine (Intelence)
- Produit naturel : Millepertuis (Hypericum perforatum)

Ces médicaments sont contre-indiqués ou doivent être évités avec Maviret^{MD}. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit vous seront proposés.

D'autres médicaments, comme la warfarine (Coumadin), la pravastatine (Pravachol), la rosuvastatine (Crestor), la digoxine (Lanoxin, Toloxin), la cyclosporine (Neoral), le tacrolimus (Prograf), peuvent aussi interagir avec Maviret^{MD} et des ajustements de doses ou un suivi plus étroit peuvent être nécessaires. Vous devez informer votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les principaux effets indésirables observés de Maviret^{MD} sont d'intensité légère et ne nécessite pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si vous avez des vomissements :

- **Moins de 3 heures après la prise de Maviret^{MD},** il faut reprendre une autre dose avec de la nourriture.
- **Plus de 3 heures après la prise de Maviret^{MD},** il faut reprendre la dose suivante avec de la nourriture au moment prévu initialement.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Maviret^{MD} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du glécaprévir et du pibrentasvir chez la femme enceinte. Les femmes en âge de procréer devraient utiliser une méthode de contraception adéquate.

Discutez-en avec votre médecin.

La présence du glécaprévir, du pibrentasvir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Maviret^{MD}.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Maviret^{MD} entre 2 °C et 30 °C (36 ° et 86 °F).

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 18 h



Prenez la dose oubliée avec de la nourriture dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose avec de la nourriture selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose

Si plus de 18 h

