



Comment ce médicament agit-il ?

Vosevi^{MC} est une combinaison de trois médicaments, soit sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprévir, indiqués pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Vosevi^{MC} bloque plusieurs étapes du processus de réplication du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Vosevi^{MC} → 1 comprimé **1 fois** par jour

Ce médicament doit être pris **avec de la nourriture**.

Il est important de prendre Vosevi^{MC} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement.

La durée est de 12 semaines. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

Est-ce que je peux prendre Vosevi^{MC} avec mes autres médicaments?

Informez votre professionnel de la santé particulièrement si vous prenez ce qui suit:

- Médicaments pour traiter les caillots sanguins comme le dabigatran étexilate (Pradaxa)
- Médicaments pour le traitement de la tuberculose comme la rifampine (Rifater, Rifadin, Rofact), la rifabutine (Mycobutin), la rifapentine
- Médicaments pour prévenir les crises convulsives comme la carbamazépine (Tégrétol), l'oxcarbamazépine (Trileptal), le phénobarbital (Phenobarb), la phénytoïne (Dilantin)

- Médicaments pour prévenir les rejets de greffe comme la cyclosporine (Neoral)
- Médicaments pour traiter l'arythmie cardiaque comme l'amiodarone (Cordarone)
- Médicaments pour abaisser le taux de cholestérol comme la rosuvastatine (Crestor)
- Médicaments contre le VIH comme l'atazanavir (Reyataz), le lopinavir (Kale-tra), l'éfavirenz (Sustiva, Atripla), l'étravirine (Intelence)
- Produit naturel : Millepertuis (Hypericum perforatum)

Ces médicaments sont contre-indiqués ou doivent être évités avec Vosevi^{MC}. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit vous seront proposés.

Si vous prenez des médicaments contre l'indigestion, les brûlures d'estomac ou les ulcères, vous devrez peut-être prendre Vosevi^{MC} à un moment différent. Par exemple, nizatidine (Axid), famotidine (Pepcid), cimétidine (Tagamet), ranitidine (Zantac), oméprazole (Losec), esoméprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), rabéprazole (Aciphex), pantoprazole (Pantoloc) ou des antiacides (Maalox, Gaviscon).

D'autres médicaments, comme l'atorvastatine (Lipitor), la fluvastatine (Lescol), la pravastatine (Pravachol), la simvastatine (Zocor), la digoxine (Lanoxin, Toloxin), l'éthinylestradiol (présent dans certains contraceptifs oraux), peuvent aussi interagir avec Vosevi^{MC} et des ajustements de doses ou un suivi plus étroit peuvent être nécessaires. Vous devez informer votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les principaux effets indésirables observés de Vosevi^{MC} sont d'intensité légère et ne nécessite pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Maux de tête
- Fatigue
- Diarrhées
- Nausées
- Troubles du sommeil
- Perte d'énergie ou de force

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si vous avez des vomissements :

- **Moins de 4 heures après la prise de Vosevi^{MC},** il faut reprendre une autre dose.
- **Plus de 4 heures après la prise de Vosevi^{MC},** il faut reprendre la dose suivante au moment prévu initialement.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou pharmacien.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Vosevi^{MC} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 18h



Grossesse et allaitement

On ne connaît pas les effets du sofosbuvir, du velpatasvir et du voxilaprévir chez la femme enceinte. Les femmes en âge de procréer devraient utiliser une méthode de contraception adéquate.

Discutez-en avec votre médecin.

La présence du sofosbuvir, du velpatasvir, du voxilaprévir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Vosevi^{MC}.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Vosevi^{MC} à une température inférieure à 30°C (86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Si plus de 18h