



### Comment ce médicament agit-il ?

Zepatier<sup>MD</sup> est une combinaison de deux médicaments, soit l'elbasvir et le grazoprévir, indiqués pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Zepatier<sup>MD</sup> bloque plusieurs étapes du processus de réPLICATION du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

### Comment prendre ce médicament ?

Zepatier<sup>MD</sup> → 1 comprimé **1 fois** par jour

Zepatier<sup>MD</sup> peut vous être prescrit seul ou associé à d'autres médicaments contre les VHC, comme le sofosbuvir (Sovaldi) et/ou la ribavirine (Ibavyr).

Il est important de prendre Zepatier<sup>MD</sup> de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 8, 12 jusqu'à 16 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De votre condition hépatique
- De la réponse à un traitement antérieur
- De votre condition rénale

### Est-ce que je peux prendre Zepatier<sup>MD</sup> avec mes autres médicaments ?

Informez votre professionnel de la santé particulièrement si vous prenez ce qui suit:

- Médicaments pour prévenir les rejets de greffe comme la cyclosporine (Neoral)
- Médicaments contre les infections causées par des champignons comme le kéroconazole

- Médicaments pour prévenir les crises convulsives comme la carbamazépine (Tégrétol), l'oxcarbazépine (Trileptal), le phénobarbital (Phenobarb), la phénytoïne (Dilantin)
- Médicaments pour le traitement de la tuberculose comme la rifampine (Rifater, Rifadin, Rofact), la rifabutine (Mycobutin)
- Médicaments pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire comme le bosentan (Tracleer)
- Médicaments pour aider les personnes à rester éveillé comme le modafinil (Alertec)
- Médicaments contre le VIH comme l'atazanavir (Reyataz), le darunavir (Prezista, Prezcobix), le ritonavir (Norvir), le lopinavir (Kaletra), le tipranavir (Aptivus), l'éfavirenz (Sustiva, Atripla), l'étravirine (Intelence), l'elvitégravir/cobicistat (Stribild, Genvoya)
- Produit naturel : Millepertuis (Hypericum perforatum)

Ces médicaments sont contre-indiqués ou doivent être évités avec Zepatier<sup>MD</sup>. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit vous seront proposés.

D'autres médicaments peuvent aussi interagir avec Zepatier<sup>MD</sup>, vous devez informer votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

### Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Zepatier<sup>MD</sup> ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les principaux effets indésirables observés de Zepatier<sup>MD</sup> sont d'intensité légère et ne nécessite pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Mode de conservation

Conservez les comprimés de Zepatier<sup>MD</sup> dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

## Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de l'elbasvir et du grazoprévir chez la femme enceinte. Les femmes en âge de procréer devraient utiliser une méthode de contraception adéquate.

Discutez-en avec votre médecin.

La présence de l'elbasvir, du grazoprévir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Zepatier<sup>MD</sup>.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

## J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 16 h



Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

**Ne doublez pas la dose**



Si plus de 16 h