



Comment ce médicament agit-il ?

Cabenuva^{MD} est une association de 2 antirétroviraux : le cabotégravir et la rilpivirine. Ce sont des antirétroviraux qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

La rilpivirine fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, une enzyme, et elle agit en inhibant cette enzyme. Le cabotégravir est un antirétroviral qui agit sur une autre enzyme appelée l'intégrase. Le virus a besoin de ces enzymes pour se multiplier dans l'organisme. Ainsi la combinaison de ces antirétroviraux, lorsque reçu fidèlement, maintient la charge virale indétectable et permet de rester en santé.

I = I

En présence d'une charge indétectable, vous ne risquez pas de transmettre le VIH. Indétectable = Intransmissible (I = I). Par contre, en présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par le sang. Vous devez donc prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Comment prendre ce médicament ?

Cabenuva^{MD} sera administré par votre professionnel de la santé en deux injections sur chacun des muscles fessiers.

Avant de débuter les injections de Cabenuva^{MD}, **optionnellement** un traitement préliminaire par voie orale avec Vocabria^{MD} et Edurant^{MD} pendant au moins 28 jours, y compris le jour de la première injection, vous sera prescrit.

Cabenuva^{MD} → donné **une fois par mois** les deux premiers mois et habituellement **une fois tous les deux mois** à partir du quatrième mois.

Votre professionnel de la santé déterminera le schéma d'administration qui vous convient le mieux.

La date de la première injection initiale devient la date de traitement cible pour l'administration des injections subséquentes. Les doses suivantes peuvent être administrées 7 jours avant ou 7 jours après la date de traitement cible quelle que soit la date à laquelle l'injection a été faite précédemment. Il est important de vous présenter aux rendez-vous prévus pour recevoir les injections.

Est-ce que je peux recevoir Cabenuva^{MD} avec mes autres médicaments?

Les médicaments suivants sont contre-indiqués et ne doivent pas être pris avec Cabenuva^{MD} :

- Carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital ou phénytoïne pour prévenir les convulsions.
- Rifampicine, rifabutine ou rifapentine pour traiter la tuberculose.
- Dexaméthasone (plus d'une dose) pour traiter l'inflammation et les réactions allergiques.
- Produit naturel contenant du millepertuis (Hypericum perforatum) pour traiter la dépression.

Les médicaments suivants pourraient aussi interagir avec Cabenuva^{MD} :

- Clarithromycine, érythromycine et méthadone.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de prendre ces médicaments. Une solution de rechange, des ajustements de doses ou un suivi plus étroit vous seront proposés si nécessaire.

D'autres médicaments ou produits pourraient interagir avec Cabenuva^{MD}. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Réactions au point d'injection : douleur et malaise, masse ou bosse dure, enflure, rougeur, démangeaisons, ecchymoses et sensation de chaleur. Ces effets sont habituellement d'intensité légère mais peuvent être plus importants pour certains individus. La durée de ces effets serait d'environ trois jours après l'injection. Avec le temps et les doses subséquentes l'apparition et la durée de ces réactions tendent à diminuer.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou de symptôme non mentionné dans le présent document ou aggravation

d'un symptôme vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin

Éruption cutanée sévère avec ou sans :

- Fièvre
- Grande fatigue, manque d'énergie
- Douleurs musculaires ou articulaires



Suivi médical : Par des prises de sang régulières et autres tests si nécessaire, votre médecin surveillera les effets du médicament sur votre système.

J'ai omis une injection !

Si vous devez sauter, ou avez sauté, une injection :

Dites-le dès que possible à votre médecin ou à votre professionnel de la santé.

Votre médecin pourrait vous recommander de prendre les comprimés de Vocabria^{MD} et d'Edurant^{MD} ou de reprendre votre ancienne thérapie antirétrovirale orale jusqu'à ce que vous puissiez recevoir de nouveau les injections de Cabenuva^{MD}.

Si la prise orale de Vocabria^{MD} et d'Edurant^{MD} ou de votre ancienne thérapie antirétrovirale est :

< 30 jours : reprendre les injections comme vous aviez l'habitude.

≥ 30 jours : vous devrez recevoir les injections une fois par mois pour les deux premiers mois. Discutez de votre nouveau calendrier d'administration avec votre médecin ou votre pharmacien.

Ne changez pas votre schéma d'administration sans en discuter avec votre professionnel de la santé.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Cabenuva^{MD} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Mode de conservation

Conservez Cabenuva^{MD} dans sa boîte d'origine au réfrigérateur entre 2 et 8°C jusqu'à son utilisation. Ne le congelez pas.

Gardez ce médicament hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____