



Comment ce médicament agit-il ?

Kaletra^{MD} est une association de 2 antirétroviraux : le lopinavir et le ritonavir, qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le ritonavir est aussi utilisé pour potentialiser l'effet du lopinavir.

Le lopinavir et le ritonavir font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de la protéase, une enzyme, et ils agissent en inhibant cette enzyme. Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme. Ainsi Kaletra^{MD}, lorsque pris fidèlement en association avec d'autres antirétroviraux, maintient la charge virale indétectable et permet de rester en santé.

I = I

En présence d'une charge indétectable, vous ne risquez pas de transmettre le VIH. Indétectable = Intransmissible (I = I). Par contre, en présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par le sang. Vous devez donc prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Comment prendre ce médicament ?

Kaletra^{MD} doit être pris en association avec d'autres antirétroviraux.

Kaletra^{MD} → 2 comprimés 2 fois par jour

Il peut être pris **avec ou sans nourriture**. Kaletra^{MD} peut être prescrit en dose de 4 comprimés à 200/50 mg **1 fois** par jour à certains patients. Votre médecin vous dira quelle posologie utiliser.

Il est important de prendre Kaletra^{MD} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre Kaletra^{MD} avec mes autres médicaments?

Les médicaments suivants sont contre-indiqués ou doivent être évités avec Kaletra^{MD} :

- Acide fusidique, abémaciclib, alfuzosine, amiodarone, colchicine (chez patients avec insuffisance rénale et/ou hépatique), dasatinib, dérivés ergoléniques (dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, méthylergonovine), dronedarone, encorafénib, glécaprévir/pibrentasvir, lomitapide, lovastatine, luridine, midazolam (par voie orale), nératiniib, nilotinib, pimozide, quetiapine, ranolazine, rivaroxaban, salmétérol, sildénafil (pour traiter problèmes pulmonaires), simvastatine, triazolam, vardénafil et vénétoclax en raison du risque d'effets indésirables sérieux.
- Apalutamide, Carbamazépine, éfavirenz, étravirine, modafinil, névirapine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne, rifampicine et produits contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) car ils peuvent compromettre l'efficacité de Kaletra^{MD}.

Plusieurs autres médicaments ou produits interagissent ou pourraient interagir avec Kaletra^{MD}. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance, un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif. Une solution de recharge, des ajustements de doses ou un suivi plus étroit vous seront proposés si nécessaire.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Effets normaux et habituellement légers qui disparaîtront avec le temps ou peuvent être traités :

- Diarrhées, douleurs à l'estomac
- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées et vomissements

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou de symptôme non mentionné dans le présent document ou aggravation d'un symptôme vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Si vous êtes porteur de l'hépatite B ou C, vous courez un risque plus élevé de problèmes hépatiques.

Consulter rapidement votre médecin ou pharmacien

- Urine foncée, jaunissement de la peau ou de l'œil
- Étourdissements, palpitations, battements cardiaques irréguliers

Cessez le médicament et présentez-vous **IMMÉDIATEMENT** dans une clinique ou aux urgences

Éruption cutanée sévère avec ou sans :

- Fièvre
- Manque d'énergie (fatigue)
- Douleurs musculaires ou articulaires



Suivi médical : Par des prises de sang régulières et autres tests si nécessaire, votre médecin surveillera les effets du médicament sur votre système.

J'ai oublié une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire habituel.



S'il est presque temps de prendre votre prochaine dose :

Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre Kaletra^{MD} et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Kaletra^{MD} à température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien.

Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Kaletra^{MD} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____