



La **prophylaxie post-exposition**, ou **PPE**, est une méthode de prévention de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) reposant sur l'utilisation rapide de médicaments antirétroviraux suite à une exposition avec un risque important de contracter le VIH.

Comment ce médicament agit-il ?

Tivicay^{MD} est le nom commercial du dolutégravir, un antirétroviral qui agit en empêchant la multiplication du VIH. Il fait partie d'une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'intégrase. Ce médicament inhibe une enzyme dont le VIH a besoin pour se multiplier dans l'organisme.

Tivicay^{MD}, accompagné d'autres antirétroviraux, est utilisé le plus rapidement possible après une exposition au VIH afin d'empêcher le virus de se propager dans votre organisme et d'éviter ainsi une infection.

Comment prendre ce médicament ?

Tivicay^{MD} → 1 comprimé **1 fois** par jour,
soit toutes les 24 heures.

Tivicay^{MD} peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de le prendre de façon régulière, à la même heure chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire habituel.

S'il reste moins de 4 heures avant votre prochaine dose :



Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Tivicay^{MD} est généralement bien toléré.

Les effets indésirables qui peuvent être observés chez certaines personnes sont des maux de tête, de la douleur musculaire, de la fatigue et, parfois, des troubles digestifs.

Si des effets indésirables se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin, une infirmière ou une diététiste afin de trouver des solutions visant à les gérer.

Grossesse

Tivicay^{MD} est un antirétroviral sécuritaire lors de la grossesse.

Est-ce que je peux prendre Tivicay^{MD} avec mes autres médicaments ?

Les médicaments suivants sont contre-indiqués et ne doivent pas être pris avec Tivicay^{MD}:

- Dofétilide pour traiter des troubles cardiaques.
- Fampridine pour traiter la sclérose en plaques.

Ces médicaments pourraient interagir avec Tivicay^{MD}:

- Rifampicine pour traiter certaines infections bactériennes comme la tuberculose.
- Carbamazépine, oxcarbazépine, phénytoïne ou phénobarbital pour prévenir les convulsions.
- Metformine pour traiter le diabète.
- Enzalutamide pour traiter le cancer de la prostate.
- Produits naturels contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) pour traiter la dépression.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de les prendre. Une solution de rechange, des ajustements de doses ou un suivi pourront être suggérés si nécessaire.

- Médicaments contenant des cations polyvalents (antiacides, laxatifs, sucralfate) peuvent diminuer l'absorption de Tivicay^{MD} : Tivicay^{MD} doit être pris 2 heures avant ou 6 heures après ces médicaments.
- Suppléments de calcium ou de fer : Tivicay^{MD} avec de la nourriture peut être pris avec le calcium ou le fer sans espacement de dose. Tivicay^{MD} à jeun doit être pris 2 heures avant ou 6 heures après le calcium ou le fer.

D'autres médicaments ou produits pourraient aussi interagir avec Tivicay^{MD}. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance, un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Tivicay^{MD} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Évitez également de sauter une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre traitement.

Afin d'éviter la transmission de l'infection dans les trois mois suivant l'exposition

- Éviter tout rapport sexuel ou utiliser des condoms;
- Éviter la grossesse, s'abstenir d'allaiter, de donner du sang, du plasma, des organes, des tissus ou du sperme.

Et en tout temps : évitez de partager des seringues.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Tivicay^{MD} dans un endroit sec à température inférieure à 30°C (86°F).

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin qu'ils puissent suivre étroitement votre état de santé.